

種 類	対 象 年 齢		標 準 的 な 接 種 期 間	回 数	間 隔 ・ そ の 他	他 の 予 防 接 種 と の 間 隔
RSウイルス 母子免疫ワクチン	妊娠28週0日から36週6日までの妊婦			1回	妊娠ごとに1回	制限なし
ロタウイルス (ロタリックス1価)	出生6週0日後～24週0日後		(初回接種) 生後2か月～ 出生14週6日後	2回	27日以上あける	
ロタウイルス (ロタテック5価)	出生6週0日後～32週0日後			3回		
※Hib(ヒブ)感染症	初回	生後2か月～5歳未満	生後2か月～ 7か月未満で開始	3回	27日以上あける	
	追加		初回終了後 7か月～13か月あける	1回	初回終了後7か月以上あける	
※小児用肺炎球菌 感染症	初回	生後2か月～5歳未満	生後2か月～ 7か月未満で開始	3回	27日以上あける	
	追加		生後12か月～ 15か月未満	1回	初回終了後60日以上あけ、 かつ生後12か月以降	
B型肝炎	1回目	1歳未満	生後2か月～9か月未満	3回		
	2回目				1回目終了後27日以上あける	
	3回目				1回目終了後139日以上あける	
五種混合 ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ Hib(ヒブ)	1期 初回	生後2か月～ 90か月未満	生後2か月～7か月未満	3回	20日以上あける	
	1期 追加		1期初回終了後 6か月～18か月あける	1回	1期初回終了後6か月以上あける	
BCG { 結核 }	1歳未満		生後5か月～8か月未満	1回		注射生ワクチンの 場合27日以上
{ 水痘 水ぼうそう }	1回目	生後12か月～ 36か月未満	生後12か月～15か月未満	1回		
	2回目		1回目終了後6か月～ 12か月あける	1回	1回目終了後3か月以上あける	
{ MR 麻しん 風しん }	1期	生後12か月～24か月未満		1回	1歳になったら早めに接種を	
	2期	5歳～7歳未満であって、小学校就学前の1年間 (令和8年度対象者：令和2年4月2日～令和3年4月1日生まれ)		1回		
日本脳炎	1期 初回	生後6か月～ 90か月未満	3歳	2回	6日以上あける	
	1期 追加		4歳	1回	1期初回終了後6か月以上あける	
	2期	9歳～13歳未満	9歳	1回		
{ 2種混合 ジフテリア 破傷風 }	2期	11歳～13歳未満	11歳	1回		制限なし
子宮頸がん	小学6年～高校1年に 相当する年齢の女子		中学1年	接種開始年齢によって、回数・接種間隔が 異なります		