

種類	対象年齢		標準的な接種期間	回数	間隔	他の予防接種との間隔
ロタウイルス感染症	ロタリックス(1価ワクチン) 生後6週0日後～24週0日後		(初回接種) 生後2か月～ 出生14週6日後	2回	27日以上あける	制限なし
	ロタテック(5価ワクチン) 生後6週0日後～32週0日後			3回		
Hib(ヒブ)感染症	初回	生後2か月～5歳未満	生後2か月～7か月未満で開始	3回	27日以上あける	
	追加		初回終了後 7か月～13か月あける	1回	初回終了後7か月以上あける	
小児用肺炎球菌感染症	初回	生後2か月～5歳未満	生後2か月～7か月未満で開始	3回	27日以上あける	
	追加		生後12か月～ 15か月未満	1回	初回終了後60日以上あけ、 かつ生後12か月以降	
B型肝炎	1回目	1歳未満	生後2か月～9か月未満	3回		
	2回目				1回目終了後27日以上あける	
	3回目				1回目終了後139日以上あける	
五種混合 (ジフテリア 百日咳 破傷風 ポリオ Hib(ヒブ))	1期 初回	生後2か月～ 90か月未満	生後2か月～7か月未満で開始 20日～56日あける	3回	20日以上あける	
	1期 追加		1期初回終了後 6か月～18か月あける	1回	1期初回終了後6か月以上あける	
BCG	1歳未満		生後5か月～8か月未満	1回	—	注射生ワクチン の場合27 日以上
水痘 (水ぼうそう)	1回目	生後12か月～ 36か月未満	生後12か月～15か月未満	1回		
	2回目		1回目終了後6か月～12か月あける	1回	1回目終了後3か月以上あける	
MR (麻しん 風しん)	1期	生後12か月～24か月未満		1回	—	
	2期	5～7歳未満であって、小学校就学前の1年間 ※令和7年度対象者:平成31年4月2日～令和2年4月1日生まれ		1回	—	
日本脳炎	1期 初回	生後6か月～ 90か月未満	3歳	2回	6日以上あける	制限なし
	1期 追加		4歳	1回	1期初回終了後6か月以上あける	
	2期	9歳～13歳未満	9歳	1回	—	
2種混合 (ジフテリア 破傷風)	2期	11歳～13歳未満	11歳	1回	—	
ヒトパピローマウイルス感染症	小学6年～高校1年に 相当する年齢の女子		中学1年	2 回 ＋ 3 回	サーバリックス(2価)	
					ガーダシル(4価)	
					シルガード9(9価)	